

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3T	GLEJOVÁ CHUDÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA (PODMÁČENÁ - SE SMRKEM) <i>Abieto-Quercetum piceosum paludosum oligotrophicum</i>	DB 18-22	• poklesliny a ploché úžlabiny, v obvodu chudších hornin, v pahorkatinách i pánvích, glej planický, histický podzolovaný, podzol až pseudoglej glejový zrašelinělý , písčitohlinitá až jílovitohlinitá s vysokým stavem podzemní vody • PLO: 10,15 • 205,02 ha 0,01 %	DB 1-5 JD 2-3 SM ±2 BO ±2 BŘ(BŘP) ±2 (OS OL) ±2	
		JD 22		• <i>Molinia sp.</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Calamagrostis canescens</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Sphagnales</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Equisetum sylvaticum</i>	
		BO 20-24		L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy	
		EP 3		3AB4 - Abieti-querceta roboris-piceae	
		PP 2		LDA04 - <i>Holco mollis-Quercetum roboris</i>	
		IH - D			
		2,88			
Je azonálním společenstvem (edafickým klimaxem), v němž půdní podmínky překrývají rozdíly klimatické blízkých lvs. Základní dřevinou je DB, příměs JD stoupá s chladnější polohou (inverze). Významná je příměs pionýrských dřevin a BO, která hluboce prokořeňuje (zpevňuje). V cílové skladbě je BO nejproduktivnější, DB a JD zajišťují trvalost ekosystému i desukci s přispěním BŘ(BŘP) i SM					
Lesní typy:					
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		bezkolencová	3T-	modální
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

