

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
3W	VÁPENCOVÁ DUBOVÁ BUČINA <i>Querceto-Fagetum calcarium</i>	SM 26	• v Českém a Moravském krasu, v oblasti vápenců v předhůří Šumavy, Podbeskydská pahorkatina, na hřebenech a svazích, kambizem modální karbonátová, vyluhovaná karbonátová, rendzina kambická , hluboká, mírně kamenitá • PLO: 10,12,15,30,33,37,39 • 1 770,18 ha – 0,06 %	BK 6-8 DB 1-3 JD 0± HB ±1 JV ±1 JS ±1 JL + LP 0-1 břek 0± (tis +) • <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Lathyrus vernus</i> , <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Calamintha clinopodium</i> + vápnomilné druhy L5.3 - Vápnomilné bučiny 3BD-D3 - <i>Querci-fageta tiliae</i> LBD01 - <i>Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae</i>	
		BO 26			
		DB 24			
		BK 26			
		EP 4			
		PP 4			
		IH - D			
5,74					
Je přechodným společenstvem, jehož vývoj ke klimaxu není ukončen, půda je v různém stupni vývoje. Ne zcela vyvinuté půdy na horních částech svahů a hřebenech tvoří přechod ke kat. „C“, na stinných (kam.) svazích ke kat. „A“. Vyvinutější půdy, blízké klimaxu (± odvápněné) přecházejí do kat. „B“. Půdní i klimatické podmínky vyhovují BK i cenným listnáčům, DBZ ustupuje, JD se váže na báze svahů.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		- podle oblastí	3W-	modální
2	-		- podle oblastí		
3	bohatší		válečková		
4	sušší		(v exponovaných polohách)		
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-		svahová	3We	svahová

