

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISŤE (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4A	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA <i>Tilieto-Fagetum acerosum lapidosum</i>	SM 28	• z pahorkatin do vrchovin, suťovité svahy a hřebeny, kambizem rankerová nebo modální mezotrofní-eutrofní, ranker kambický mezotrofní-eutrofní, rendzina , vlhkostně příznivá, silně kamenitá, nitrofilní • PLO: 3-7,10-12,15,16,18-21,23,24,26-31, 33,37-41 • 11 694,32 ha – 0,43 %	BK 6-9 JV 1-2 LP ±2 DB ±1 JD ±2 HB + JS + JL + břek 0± TR 0±	
		DB 26		• <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Galeobdolon luteum</i> , <i>Lamium maculatum</i> , <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Dentaria enneaphyllos</i> , <i>Festuca altissima</i> , <i>Galium odoratum</i> , <i>Geranium robertianum</i> , <i>Melica uniflora</i> , <i>Bromus benekenii</i> , <i>Lunaria rediviva</i>	
		BK 28		L5.1/L5.3 - Květnaté bučiny/Vápnomilné bučiny	
		EP 4		4BC3/4CD(2)3 - Fageta aceris/Acereta fagi	
		PP 4		LBC02/LBC01/LBC03/LBC04/LBD01 - <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae</i>	
		IH - D			
		7,33			
		Zaujímá v rámci klimaxových BK ne zcela vyvinuté, skeletovité (do 70 %) půdy, hluboce prohumózněné s nitrofilními prvky ve fytocenóze a aceróznější skladbou dřevin, v níž je BK mírně omezován (z části i JD) vitální LP, LPV a cennými listnáči v porostech složité výstavby. V cílové skladbě je nositelem ekologické stability BK, charakteru společenstva LP, LPV a JV, KL. Ekonomickou dřevinou je SM i BK. Ekologicko-ekonomickou variantou je přirozená skladba s cennými sortimenty listnáčů.			
		Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
		od r. 2019		do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální			– podle oblastí	4A- modální
2	chudší			strdivková	
3	-			– podle oblastí	
4	sušší			– podle oblastí	4Ac sušší kyselejší
5	-			– podle oblastí	
6	-			– podle oblastí	
7	-				
8	roklinová			měsíčnicová	
9	specifická - vápencová			vápencová (s bažankou)	4Aw vápencová

