

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
4C	VYSÝCHAVÁ BUČINA <i>Fagetum subxerothermicum</i>	SM 24	● slunné svahy a hřbety, na bohatých horninách z pahorkatin do předhůří, kambizem modální až rankerová mezotrofní-eutrofní, často vyluhovaná karbonátová, pararendzina kambická, ranker kambický , přesýchavá ● PLO: 2-5,10,12,16,18,23,24,26,28-31,33,39 ● 3 685,82 ha – 0,13 %	BK 6-8 DB ±2 JD 0-1 BO 0-1 HB 0± LP ±2 JV 0± JS 0±		
		BO 22		● <i>Poa nemoralis</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> , <i>Genista tinctoria</i> , <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> , <i>Pyrethrum corymbosum</i> , <i>Campanula persica</i>		
		EP 4		L5.1/L5.4/L5.3 - Květnaté bučiny/Acidofilní bučiny/Vápnomilné bučiny		
		PP 4		4B3/4AB3/4BD-D2 - Fageta typica/Fageta abietino-quercina/Fageta tiliae humilia		
		IH - D		LBC01/LBC03/LBE01/LBD01 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae</i>		
		3,96				
	Zaujímá v klimatickém stupni bučin polohy mezoklimaticky méně příznivé, s letním vysýcháním půd a zrychlenou mineralizací opadu (mělkým humusovým horizontem). V rozvolněných porostech zcela převažuje BK, příměs tvoří LP a konkurenčně slabý DBZ, v příznivějších lokalitách JD a JV. V cílové skladbě je ekonomickou dřevinou BO a také kvalitní BK, který v úrovni dociluje i kvalitních sortimentů (může převládat a podílí se i na spodní krycí (meliorační) etáži.					
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				4Ck	antropogenní
1	modální		– podle oblastí		4C-	modální
2	chudší		lipnicová		4Cm	chudší
3	bohatší		vápencová			
4	-		vápnitá s ostřicí prstnatou			
5	-		s válečkou prapořitou			
6	-				4Ce	svahová
7	-					
8	specifická - vápnitá					
9	specifická - vápencová		svahová		4Cw	vápencová

