

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4H	HLINITÁ BUČINA (SVĚŽÍ) <i>Fagetum illimerozum mesotrophicum</i>	SM 28	• na plošinách a mírných sklonech i v úžlabinách, z pahorkatin do nižších vrchovin, na bohatších deluviích nebo překryvech spraš. hlín, luvizem, mezotrofní kambizem luvická či oglejená a ojediněle hnědozem , čerstvě vlhká • PLO: 5,7,10,12,15,16,18, 20,23, 24,26-31,33,36-41 • 12 469,33 ha – 0,45 %	BK 8-10 JD ±3 DB ±1 LP ±1 HB + JV + (JS JL) 0±	
		BO 26		• <i>Luzula pilosa, Galium odoratum, Actaea spicata, Carex sylvatica, Oxalis acetosella, Rubus fruticosus, Stachys sylvatica, Carex digitata, Senecio nemorensis agg., Carex pilosa</i>	
		DB 26		L5.1 - Květnaté bučiny	
		BK 26		4B3 - Fageta typica	
		EP 1		LBC01/LBC03 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae/Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>	
		PP 5,5			
		IH – A			
		6,44			
Má v rámci klimaxových bučin specifické jen fyzikální vlastnosti překryvné vrstvy půdy se sklonem k uléhání a k oglejení a s méně příznivou humifikací (mělké prohumóznění). Skladbou, strukturou i produkcí porostů se neliší od bohaté BK (JD je zde vždy). V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému především BK, význam JD stoupá s uléhavostí a ochuzením půd. BK i JD zasahují z větší části do úrovně a podílí se na stabilitě i produkci SM porostů.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		šťavelová	4H-	modální
2	-		– podle oblastí		
3	bohatší		oglejená		
4	-		– podle oblastí	4Hc	sušší, kyselejší
5	vlhčí		bukovincová	4Hg	vlhčí
6	-		na písku s překryvem hlíny		
7	-				
8	-				
9	-				

