

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4I	Kyselá hlinitá BUČINA (ULÉHAVÁ) <i>Fagetum illimerosum acidophilum</i>	SM 26	• plošiny a mírné svahy v pahorkatinách a vrchovinách, překryvy hlín, luvizem modální, oglejená oligotrofní, kambizem luvická, oglejená oligotrofní, hluboká, uléhavá • PLO: 7,10,12,15,16,18- 21,23,24,26,28-31,33 • 12 983,33 ha – 0,47 %	BK 7-8 DB ±2 JD ±2 LP 0± BO 0± BŘ 0±	
		BO 24		• <i>Luzula pilosa</i> , <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Carex pilulifera</i> , <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Galium rotundifolium</i> , <i>Maianthemum bifolium</i>	
		DB 24		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		BK 26		4AB3/4A3 - Fageta abietino-quercina/Fageta quercino-abietina	
		EP 1		LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis</i> - <i>Fagetum sylvaticae</i>	
		PP 4			
		IH - A			
		5,47			
Klimaxová bučina typická pro ilimerizovaná stanoviště 4. lvs je zde ve vitalitě BK poněkud oslabena, zejména na chudších typech při zhutnění půdy a ochuzení hlinitého překryvu, takže se v přirozené skladbě vedle JD udržel ještě i DBZ. V cílové skladbě se trvalost ekosystému váže na BK i JD v úrovni i podúrovni, kde působí melioračně. DBZ lokálně přispívá ke zpevnění porostních okrajů, příměs BO ke zpevnění i produkci porostu.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	s bikou chlupatou (a metličkou křivolakou)		4I-	modální
2	chudší	chudší		4Im	chudší
3	-	oglejená (s bikou chlupatou)		4Ig	vlhčí
4	-	- podle oblastí			
5	vlhčí	s bikou chlupatou a ostružínkem			
6	-	borůvková			
7	-				
8	-				
9	-				

