

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4M	CHUDÁ BUČINA (BOROVÁ) <i>Fagetum oligotrophicum</i>	SM 22	- chudé substráty ve vyšších pahorkatinách a vrchovinách, na slunných svazích zachází i do vyšších předhůří, kambizem dystrická podzolovaná, podzol arenický, středně hluboká, slabě vysychavá půda - PLO: 7,10-12,15,16,18,21,23, 24,26,28-31,33,39-41 4 882,40 ha – 0,18 %	BK 4-8 DB ±3 JD ±1 BO ±2 BŘ ±1	
		BO 22		<i>Vaccinium vitis-idaea</i>, <i>Vaccinium myrtillus</i>, <i>Calluna vulgaris</i>, <i>Dicranum scoparium</i>, <i>Leucobryum glaucum</i>, <i>Avenella flexuosa</i>, <i>Polytrichum formosum</i>, <i>Pleurozium schreberi</i>	
		EP 1		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		PP 2		4A3 - Fageta quercino-abietina	
		IH - C		LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis</i> - <i>Fagetum sylvaticae</i>	
		3,03			
Nepříznivě ekologické podmínky vytvořené chudým půdním prostředím s hromaděním nerozloženého humusu ovlivňuje v některých oblastech i kontinentálnější klima a umožňuje vedle vitálně slabšího BK a málo vzrůstné JD ještě existenci DBZ, BŘ a pomístně i BO ve společenstvu s charakterem chudého (edafického) klimaxu. V cílové skladbě není nutné pracně udržovat přirozenou (okrajovou) příměs DBZ a JD. Trvalost ekosystému plně zajistí BK (částečně BŘ), především svou meliorační (i podpůrnou) funkcí.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019				do r. 2018	
0	antropogenní			4Mk	antropogenní
1	modální		mechová	4M-	modální
2	chudší		brusinková		
3	-		borůvková (s vřesem)		
4	-		na kaolinických podzolech		
5	vlhčí				
6	-				
7	skeletnatější				
8	-				
9	-		svahová	4Me	svahová

