

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘÍROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4N	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA <i>Fagetum lapidosum acidophilum</i>	SM 26	• od pahorkatin do vrchovin, slunné kamenité svahy a hřbety, kambizem modální, rankerová, oligotrofní, méně ranker kambický, podzolový • PLO: 4-7,9-12,15,16, 18-21,23, 24,26-31,33,38-41 • 12 743,50 ha – 0,46 %	BK 7-8 DB ±2 JD ±2 LPM 0-1 BO 0-2 BŘ + HB 0± JV 0± (tis 0±)	
		BO 24		• <i>Dryopteris carthusiana, Luzula luzuloides, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea, Hieracium murorum, Carex pilulifera, Veronica officinalis, Oxalis acetosella, Polytrichum formosum</i>	
		BK 24		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		EP 4		4AB3/4A3 - Fageta abietino-quercina/Fageta quercino-abietina	
		PP 4		LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>	
		IH - D			
		4,96			
	Klimatické optimum BK se zde projevuje jeho převahou, ovšem kyselejší podloží mírně snižuje jeho vitalitu a umožňuje existenci DBZ ve světlých skupinách vedle stinných dřevin. Oproti vyvinutým půdám se zvýšená skeletovitost projeví na výstavbě porostů, méně na fytocenóze. V cílové skladbě je nositelem trvalosti ekosystému především BK (může z části nahradit JD a zcela DBZ) v mírně rozvolněných porostech s prostorovou (výběrnou) výstavbou, ale podprůměrnou zásobou.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
0	Antropogenní	sběrný typ		4Nk	antropogenní
1	Modální	s kapradí osténkatou agg.,		4N-	modální
2	Chudší	se třtinou rákosovitou			
3	Bohatší	– podle oblastí			
4	Sušší	borůvková		4Nm	chudší
5	-	biková s metličkou křivolakou			
6	-				
7	Skeletnatější				
8	-				
9	-				

