

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
40	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA <i>Querceto-Abietum variohumidum mesotrophicum</i>	SM 28	- ve vyšších pahorkatinách na zvlněných plošinách, ploché úžlabiny, báze svahů, na hlínách, pseudoglej kambický, modální mezotrofní, kambizem oglejená, mezotrofní, hnědozem oglejená, hluboká, vespod jílovitohlinitá, střídavě vlhká - PLO: 1-8,10-12,15, 16,18-21,23,24,26-31,33,37, 39-41 39 699,56 ha – 1,45 %	JD 3-5 DB 2-3 BK 2-4 LP ±1 (OS SM JV) 0±	
		BO 26		<i>Carex brizoides, Luzula pilosa, Sanicula europaea, Galium rotundifolium, Deschampsia cespitosa, Rubus fruticosus, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Brachypodium sylvaticum</i>	
		DB 24		L5.4/L5.1 - Acidofilní bučiny/Květnaté bučiny	
		BK 26		4B4 - Abieti-querceta roboris-fagi	
		EP 2		LBC05 - <i>Galio rotundifolii-Abietetum albae</i>	
		PP 5			
		IH - B			
		5,43			
Je edafickým (jedlovým) klimaxem na příznivějších oglejených půdách v relativně chladnějším mezoklimatu převážně 4. lvs. Podmínky odpovídají JD a DB méně BK, častá je OS. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému především úrovně JD a DB méně BK. BK se podílí (převážně v podúrovni) na příznivé humifikaci půd a celkové výstavbě porostu. Kompetičně se zde nevylučuje příměs DB ve SM.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní			4Ok	antropogenní
1	modální	šťavelová		4O-	modální
2	-	ostřicová		4Oc	sušší, kyselejší
3	bohatší				
4	-	šťavelová (s borůvkou) (sušší)			
5	-	- podle oblastí			
6	-	- podle oblastí			
7	skeletnatější				
8	-				
9	-			4Og	vlhčí

