

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4R	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ RELIKTNÍ SMRČINA <i>Piceetum relictum</i> <i>turfosum</i> <i>mesotrophicum</i>	SM 28	• mimo přirozený areál smrku ztepilého jako „relikty“, v pánvích, pahorkatinách a vrchovinách, organozem glejová až saprická, mezotrofní, místy glej histický , vyšší podíl zemitých částic • PLO: 1,2,5,6,11,12,15-19,23,26 • 2 210,20 ha – 0,08 %	SM 6-9 JD 0± BO 0± OL ±2 BŘ(BŘP) ±1	
		EP 4		• <i>Sphagnum</i> sp., <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Senecio nemorensis</i> agg., <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Dryopteris carthusiana</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Circaea alpina</i> , <i>Equisetum sylvaticum</i> , <i>Lysimachia vulgaris</i> , <i>Carex brizoides</i>	
		PP 4		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		IH - D		6A6 - Piceeta turfosa	
		5,68		LFC03 - <i>Equiseto sylvatici-Piceetum abietis</i>	
				Je extrazonálním společenstvem na minerálně příznivějších (mírně zahliněných) rašelinách, převážně odumřelých nebo odvodněných, se spodní vodou v dosahu rhizosféry. Půdní podmínky i mírně chladnější mezoklima umožnily existenci extrazonálního SM s příměsí BŘP a OL na oživené mokřině a JD na mezotrofní rašelině. Cílová skladba odpovídá přirozené. SM je zde staticky stabilnější (kořenový rošt, ekotyp); příměs BO vhodného ekotypu.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
0	antropogenní		sběrný typ		
1	modální		šťavelová (se třtinou chloupkatou)	4R-	modální
2	chudší		olšová		
3	-		třtinová		
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	specifická - zbahnělá				

