

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4S	SVĚŽÍ BUČINA <i>Fagetum oligomesotrophicum</i>	SM 26	• svahy, úžlabiny, na různých horninách, slabé hlinité překryvy, vyšší pahorkatiny, vrchoviny, výhradně kambizem modální, oligotrofní nebo mezotrofní , čerstvě vlhká, hluboká, hlinitá, písčitohlinitá-jílovitohlinitá, slabě štěrkovitá • PLO: 2-7,9-12,15,16,18-21, 23,24,26-31,33,36-41 • 173 002,48 ha – 6,31 %	BK 7-10 DB ±2 JD ±2 LP ±1 HB 0-1 JV 0-1 (JS JL TR OS tis) 0±	
		BK 26		• <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Carex digitata</i> , <i>Senecio nemorensis</i> agg., <i>Rubus</i> sp., <i>Galium rotundifolium</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Dryopteris carthusiana</i> , <i>Melica nutans</i> , <i>Prenanthes purpurea</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , <i>Gymnocarpium dryopteris</i>	
		BO 24		L5.1/L5.4 - Květnaté bučiny/Acidofilní bučiny	
		DB 24		4B3/4AB3 - Fageta typica/Fageta abietino-quercina	
		EP 1		LBC01/LBC03/LBE01 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>	
		PP 4,5			
		IH - A			
		6,37			
Zahrnuje typické „svěží“ BK vázané na čerstvě vlhké „šťavelové“ prostředí, středně bohaté BK s kombinací oligomezotrofní vegetace a „holé“ BK. Převážně stejnorodé porosty BK s příměsí JD mají nadprůměrnou produkci a téměř horizontální strukturu. V cílové skladbě je BK základním nositelem trvalosti ekosystému. Podílí se s JD na zpevnění porostu i kvalitě produkce v hlavní úrovni a zajišťuje i trvalou produktivnost melioračními účinky.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	– podle oblastí		4Sk	antropogenní
1	modální	šťavelová		4S-	modální
2	chudší	se svízelem drsným			
3	bohatší	s ostricí prstnatou		4Sg	vlhčí
4	sušší	biková s mařinkou		4Sh	zahliněná
5	vlhčí	– podle oblastí		4Sp	písčitá
6	hlinitější	– podle oblastí		4Sc	sušší, kyselejší
7	skeletnatější	– podle oblastí		4Sn	kamenitější
8	-	– podle oblastí		4Sw	vápencová
9	specifická - písčitá	svahová – podle oblastí		4Se	svahová

