

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4T	GLEJOVÁ CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA (PODMÁČENÁ) <i>Querceto-Abietum piceosum paludosum oligotrophicum</i>	SM 24	• v pahorkatinách a vrchovinách, v obvodu chudších hornin, hlinité překryvy, úpadliny v plošinách, úžlabiny, inverzní polohy, glej histický podzolovaný či planický, podzol glejový zrašelinělý, zamokřená, minerálně slabá, s vysokou hladinou spodní vody • PLO: 15 • 3,29 ha – + %	JD 5-6 DB ±1 SM ±2 BO ±2 BŘ(BŘP) ±2 (OL OS) +	
		BO 22		• <i>Molinia sp., Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum sp., Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris, Trientalis europaea, Ledum palustre</i>	
		EP 3		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		PP 3		4A4 – Querci-pineta abietina	
		IH - D		LBE04 - <i>Vaccinio myrtilli-Abietetum albae</i>	
		3,10			
Je azonálním společenstvem – přechod mezi 3T a 5T, v němž půdní vlastnosti překrývají značné (vice než v kat. G) rozdíly klimatické (zonální stupňovitost), především v inverzních polohách. V těchto podmínkách se vedle převažující JD přirozeně setkává SM s DB i BO a spolu s nenáročnými listnáči tvoří společenstvo typické pro tyto půdy. V cílové skladbě ustupuje DB, produkci zajišťuje BO, částečně SM, ekologickou stabilitu JD s přispěním BŘ(BŘP), OS a OL.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální				
2	-				
3	-				
4	-				
5					
6					
7					
8					
9					

