

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4W	VÁPENCOVÁ BUČINA <i>Fagetum calcarium</i>	SM 26	• v oblasti vápenců (předhůří Šumavy), na svazích i plochých hřebenech, kambizem modální karbonátová, vyluhovaná karbonátová, rendzina kambická , hluboká, svěží • PLO: 12,16,18,21,29,30,33,39,40 • 972,23 ha – 0,04 %	BK 8-10 DB ±1 JV ±1 JD ±1 HB ±1 JS ±1 LP ±1 JL + břek 0± (tis +) • <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Lathyrus vernus</i> , <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Calamintha clinopodium</i> + vápnomilné druhy L5.3 - Vápnomilné bučiny 4BD3 - Fageta tiliae LBD01 - <i>Cephalanthero damasonii</i> -Fagetum sylvaticae	
		BO 20			
		DB 20			
		BK 26			
		EP 4			
		PP 4			
		IH - D			
		5,87			
V široké škále bučin na vápenci, od dealpinské (4X) přes vysychavou (4C) až po klimaxovou BK na vyvinuté shora ± odvápněné půdě, zaujímá „bohatá BK vápencová“ přechody mezi kat. „C“ a „B“ s variantami odpovídajícími stupni vývoje půd. Půdní a klimatické optimum BK umožnilo jeho dominanci v porostech jednoduché výstavby a nadprůměrné bonity. Cílová skladba odpovídá přirozené. Vylučuje se SM.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		- podle oblastí	4W-	modální
2	-		- podle oblastí		
3	bohatší		- podle oblastí		
4	sušší		- podle oblastí		
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-		svahová	4We	svahová

