

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
4Y	SKELETOVÁ BUČINA <i>Fagetum saxatile</i>	BK 22	• jen výjimečně v pahorkatině a na slunných svazích vrchovin, suťová pole, převládá ranker kambický, litický, podzolový, litozem , na výsypkách antropozem, balvanitá, mírně vysychavá, středně hluboká • PLO: 5,7,10,12,16, 18,21,23, 26-29,31,39-41 • 2787,97 ha – 0,10 %	BK 6-8 DB ±2 BO ±2 JD 0-1 BŘ ±1 JŘ + LPM± JV± tis	
		SM 24		• <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Hieracium sp.</i> <i>Dicranum sp.</i> , <i>Asplenium sp.</i>	
		JD 20		L5.4/L5.1 - Acidofilní bučiny/Květnaté bučiny	
		EP 5		4AB-B1-2/4B1-2 - Fageta humilia	
		PP 2		LBE01/LBC01/LBC03 - <i>Luzulo luzuloidis</i> - <i>Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati</i> - <i>Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae</i> - <i>Fagetum sylvaticae</i>	
		IH - E			
		3,03			
Od typické klimaxové BK se liší sníženou vitalitou BK, která umožňuje vedle DB a JD i příměs méně náročné BŘ a BO. Specifickými podmínkami kyselé skeletnatosti se shoduje se SLT 3Y; kondenzační vláha se příznivě projevuje na produkci dřevin a příměsi JD. Pro ekologickou stabilitu porostu je optimální přirozená skladba. Při zvýšeném zastoupení BO a úpravě struktury zajišťuje toto stabilitu BK. JD je méně vitální, DB na okraji svého rozšíření.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	- podle oblastí		4Yk	antropogenní
1	modální	- podle oblastí		4Y-	modální
2	-	se štavelem			
3	bohatší	(antropogenní)			
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	specifická - roklínová	roklínová			

