

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5B	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA <i>Abieto-Fagetum mesotrophicum</i>	SM 30	• z vrchovin do předhůří a horských poloh, svahy až plošiny na bohatším podloží, kambizem modální mezotrofní-eutrofní , hluboká, čerstvě vlhká, propustná, mírně štěrkovitá • PLO: 1,3-5,7,10-13,16,18- 31,33,38,40,41 • 48 092,53 ha – 1,75 %	BK 6-8 JD 1-3 JV ±1 LP ±1 JS + JL + (tis +)	
		BO 24		• <i>Galium odoratum</i> , <i>Dentaria enneaphyllos</i> , <i>Dentaria bulbifera</i> , <i>Milium effusum</i> , <i>Sanicula europaea</i> , <i>Actaea spicata</i> , <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Prenanthes purpurea</i> , <i>Hordelymus europaeus</i> , <i>Festuca altissima</i> , <i>Polygonatum verticillatum</i>	
		BK 28		L5.1 - Květnaté bučiny	
		EP 1		5B-BD3/5B3/5B-BC3 - Abieti-fageta typica/Abieti-fageta ulmi/Abieti-fageta aceris inferiora	
		PP 6		LBC01/LBC03 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>	
		IH - A			
		8,80			
V jedlové bučině na bohaté půdě s dobou humifikací středně prohumózněné, neobohacované, má v zastoupení dřevin mírnou převahu BK nad produkčnější JD, slabou příměs KL na bohatších a SM na poněkud ochuzených typech se zhoršenou humifikací. V cílové skladbě trvalost ekosystému zajišťuje rovnocenně BK i JD, stejným podílem v úrovni i podúrovni, v porostech se složitou prostorovou výstavbou, která umožňuje přechod na výběrné formy hospodaření.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní			5Bk	antropogenní
1	modální	mařinková		5B-	modální
2	chudší	s ostružínkem			
3	nitrofilnější	s kostřavou nejvyšší			
4	-				
5	-	ostřící chlupatou			
6	-	javorová			
7	skeletnatější	– podle oblastí		5Ba	kamenitá acerozní
8	-	strdivková			
9	-	svahová (javorová)		5Be	svahová

