

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5F	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA <i>Abieto-Fagetum lapidosum mesotrophicum</i>	SM 28	• stinné kamenité svahy a hřebeny ve vrchovině, údolní svahy a rokle v pahorkatině, kambizem modální až rankerová, mezotrofní, ranker kambický , kamenitá, středně bohaté horniny • PLO: 1-4,7,10-14,16,20-29, 31,38,40,41 • 20 095,52 ha – 0,73 %	BK 5-7 JD 3-4 SM 0-1 JV ±2 JLH ±1 LP 0-1 JS 0± tis +	
		BK 26		• <i>Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Dryopteris dilatata, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris polypoides, Galium odoratum, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis agg., Prenanthes purpurea</i>	
		EP 4		L5.1 - Květnaté bučiny	
		PP 5		5B3/5BC3 - Abieti-fageta typica/Abieti-fageta aceris inferiora	
		IH - C		LBC01 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>	
		6,69			
Je na kamenité půdě přechodem mezi acerózními a chudšími klimaxovými společenstvy. Významným znakem je příznivá vlhkost, ale zhoršená humifikace (mulový moder až moder), středně bohatá vegetace a nadprůměrný vzrůst JD a BK, při lepší humifikaci i KL a JLH. Zhoršení podmínek umožňuje přirozenou příměs SM. Cílovou skladbou, prostorovou (výběrnou) výstavbou i bonitou dřevin se shoduje s klimaxovými společenstvy, vyšší je účast KL, (JLH).					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální		kapradinová	5F-	modální
2	-		kapradinová bohatší (vápnitá)		
3	bohatší		šťavelová	5Fx	vápnitá
4	sušší				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	specifická - roklinová		roklinová (potoční)	5Fu	roklinová

