

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
5H	HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA (SVĚŽÍ) <i>Abieto-Fagetum illimerosum mesotrophicum</i>	SM 30	• na plošinatých terénech vrchovin, v plochých úžlabinách vyšších pahorkatin, kambizem luvická, pelická, mezotrofní, luvizem (mezotrofní) , čerstvě vlhká • PLO: 1,3,5,10-16,19, 20,23-27, 29,31,33,40,41 • 6 160,07 ha – 0,22 %	BK 4-7 JD 3-4 LP ±1 JV 0-1 (JS JL) + SM 0±		
		BK 28		• <i>Brachypodium sylvaticum, Melica nutans, Carex sylvatica, Rubus fruticosus, Oxalis acetosella, Lathyrus vernus, Galium odoratum, Mycelis muralis, Senecio nemorensis agg., Luzula pilosa</i>		
		EP 1				
		PP 5,5				
		IH - A				
		8,61				
				L5.1 - Květnaté bučiny		
				5B3 - Abieti-fageta typica		
				LBC01 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>		
		Je variantou klimaxu na fyzikálně méně příznivých hlinitých půdách se sklonem k úléhání (oglejení, degradaci) s mělkým prohumózněním, které omezuje účast cenných listnáčů. Skladbou a výstavbou porostů se podobá se SLT 5B. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému rovným dílem BK i JD (její význam stoupá s úléháním a s oglejením půd), z větší části v úrovni s funkcí produkční i zpevňující. Porosty svojí výstavbou umožňují výběrné formy.				
		Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018				
0	antropogenní					
1	modální		šťavelová	5H-	modální	
2	-		vysokobylinná			
3	bohatší		(oglejená) (mařinková)			
4	-		oglejená	5Hg	vlhčí	
5	vlhčí					
6	-					
7	-					
8	-					
9	-					

