

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5I	Kyselá Hlinitá Jedlová bučina (uléhavá) <i>Abieto-Fagetum illimerosum acidophilum</i>	SM 28 BO 24 BK 26	• ve vrchovinách a nižších horských polohách na plošinách a mírných svazích, hlinité překryvy, luvizem modální, oglejená, kambizem luvická, oglejená oligotrofní , hluboká, uléhavá • PLO: 1-3,7,10-14,16,19-21,23-26,29-31,33 • 10 831,07 ha – 0,40 %	BK 5-7 JD 3-4 SM ±2 BO 0-1 BŘ 0±	
		EP 1		• <i>Luzula pilosa, Luzula luzuloides, Carex brizoides, Rubus fruticosus, Vaccinium myrtillus, Leucobryum glaucum, Calamagrostis villosa, Maianthemum bifolium</i>	
		PP 4		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		IH - A		5AB3 - Abieti-fageta	
		6,53		LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>	
	Minerálně chudší hlinité překryvy s uléhavou až mírně oglejenou půdou poněkud omezují vitalitu BK. Jeho podíl na přirozené skladbě s JD je vyrovnaný v úrovni i podúrovni. Při oglejení se více prosadí JD, při ochuzení půdy SM. V cílové skladbě trvalost ekosystému zajišťuje BK i JD, která je v úrovni zpevňující dřevinou, BK také meliorační.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
	0	antropogenní			
	1	modální	s bikou chlupatou (a metličkou křivolakou)	5I-	modální
	2	chudší	oglejená	5Ig	vlhčí
	3	-	oglejená (chudší)	5Im	chudší
	4	-	- podle oblastí	5It	vlhčí, chudší
	5	vlhčí			
	6	-			
	7	-			
	8	-			
	9	-			

