

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)																																																													
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ																																																													
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)																																																													
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)																																																													
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)																																																													
5K	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA <i>Abieto-Fagetum acidophilum</i>	SM 26	• především v hercynské oblasti, různý reliéf na kyselém podloží, ve vrchovinách a nižších polohách horských oblastí, kambizem modální oligotrofní, dystrická, arenická podzolovaná, středně hluboká, čerstvě vlhká, štěrkovitá • PLO: 1-5,7,9-16,18-31,33,38,40,41 • 168 772,02 ha – 6,16 %	BK 5-7 JD 3-4 SM ±2 BO 0-1 BŘ 0±																																																													
		BO 24		• <i>Luzula luzuloides</i>, <i>Avenella flexuosa</i>, <i>Vaccinium myrtillus</i>, <i>Carex pilulifera</i>, <i>Hieracium murorum</i>, <i>Maianthemum bifolium</i>																																																													
		BK 24																																																															
		EP 1																																																															
		PP 4																																																															
		IH - A		L5.4 - Acidofilní bučiny																																																													
		4,86		5AB3/5A3 - Abieti-fageta/Fageta-piceoso abietina																																																													
				LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>																																																													
Zvýšená kyselost geneticky vyvinutých půd i příznivá půdní i vzdušná vlhkost umožňují již přirozenou příměs SM v klimaxové jdBK a vytvoření prostorové výstavby se značnou stabilitou porostu. V cílové skladbě je základem trvalosti ekosystému BK i JD a plní funkci meliorační a zpevňující a s příměsí BO zvyšují porostní stabilitu i hodnotu produkce.																																																																	
<table><tr><th colspan="3">Lesní typy:</th><th colspan="2">Podsoubory lesních typů (PLT) LČR</th></tr><tr><th colspan="2">od r. 2019</th><th>do r. 2018</th><th></th><th></th></tr><tr><td>0</td><td>antropogenní</td><td></td><td>5Kk</td><td>antropogenní</td></tr><tr><td>1</td><td>modální</td><td>metlicová</td><td>5K-</td><td>modální</td></tr><tr><td>2</td><td>chudší</td><td>s ostricí kulkonosnou</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>bohatší</td><td>biková</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>sušší</td><td>biková s věsenkou nachovou</td><td>5Kd</td><td>borová</td></tr><tr><td>5</td><td>vlhčí</td><td>mechová</td><td>5Kn</td><td>kamenitější</td></tr><tr><td>6</td><td>-</td><td>borůvková (s metličkou křivolakou)</td><td>5Km</td><td>chudší</td></tr><tr><td>7</td><td>skeletnatější</td><td>metličková (se šťavelem)</td><td>5Ks</td><td>svěžejší, bohatší</td></tr><tr><td>8</td><td>-</td><td>– podle oblastí</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>-</td><td>svahová</td><td>5Ke</td><td>svahová</td></tr></table>						Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		od r. 2019		do r. 2018			0	antropogenní		5Kk	antropogenní	1	modální	metlicová	5K-	modální	2	chudší	s ostricí kulkonosnou			3	bohatší	biková			4	sušší	biková s věsenkou nachovou	5Kd	borová	5	vlhčí	mechová	5Kn	kamenitější	6	-	borůvková (s metličkou křivolakou)	5Km	chudší	7	skeletnatější	metličková (se šťavelem)	5Ks	svěžejší, bohatší	8	-	– podle oblastí			9	-	svahová	5Ke	svahová
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR																																																														
od r. 2019		do r. 2018																																																															
0	antropogenní		5Kk	antropogenní																																																													
1	modální	metlicová	5K-	modální																																																													
2	chudší	s ostricí kulkonosnou																																																															
3	bohatší	biková																																																															
4	sušší	biková s věsenkou nachovou	5Kd	borová																																																													
5	vlhčí	mechová	5Kn	kamenitější																																																													
6	-	borůvková (s metličkou křivolakou)	5Km	chudší																																																													
7	skeletnatější	metličková (se šťavelem)	5Ks	svěžejší, bohatší																																																													
8	-	– podle oblastí																																																															
9	-	svahová	5Ke	svahová																																																													

