

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (<i>KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010</i>)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (<i>BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971</i>)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (<i>VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013</i>)	
5M	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA (BOROVÁ) <i>Abieto-Fagetum oligotrophicum</i>	SM 22	• chudé substráty v obvodech vrchovin a předhůří, na svazích, na hřebenech a štěrkopísk. plošinách, kambizem dystrická, rankerová podzolovaná, podzol arenický, (humusový), středně hluboká, hlinitopísčitá, mírně kamenitá • PLO: 1-4,7,11-14,16,21-24,26, 28,29,31,33,40,41 • 8 743,17 ha – 0,32 %	BK 5-6 JD 2-3 DB 0-1 BO ±2 SM ±1 BŘ ±1	
		BO 20		• <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Dicranum scoparium</i> , <i>Dicranum undulatum</i> , <i>Polytrichum formosum</i> , <i>Pleurozium schreberi</i> , <i>Pteridium aquilinum</i>	
		BK 22		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		EP 1		5A3 - Fageta-piceoso abietina	
		PP 2		LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis</i> -Fagetum sylvaticae	
		IH - C			
		2,78			
Klima s příznivou vzdušnou vlhkostí na jedné straně a výrazně kyselé půdy s hromaděním nerozloženého humusu na straně druhé vytvářejí podmínky pro BK a JD podprůměrného vzrůstu v chudém (edafickém) klimaxu s BK a BŘ a nahrazují v těchto chudých typech JD; zajišťují melioraci a krytí půdy i podporu kvality BO.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	mechová		5M-	modální
2	chudší	brusinková			
3	-	borůvková			
4	-	metlicová			
5	vlhčí	podle oblastí			
6	-				
7	skeletnatější				
8	-				
9	-	svahová		5Me	svahová

