

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISŤE (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
50	OGLEJENÁ SVĚŽÍ BUKOVÁ JEDLINA <i>Fageto-Abietum variohumidum mesotrophicum</i>	SM 28	• vrchoviny a vyšší pahorkatiny, plošiny, ploché úžlabiny, mírně svahy, pseudoglej modální, kambický, kambizem oglejená mezotrofní , hluboká, čerstvě vlhká • PLO: 1-7,9-16,18-21,23,24,26- 31,33,40,41 • 34 339,56 ha – 1,25 %	JD 4-7 BK 1-3 SM 0-1 DB 0-1 OL + OS 0±		
		BO 26		• <i>Luzula pilosa, Carex brizoides, Equisetum sylvaticum, Deschampsia cespitosa, Maianthemum bifolium, Senecio nemorensis agg., Oxalis acetosella, Rubus fruticosus, Galium rotundifolium</i>		
		BK 26		L5.4/5.1 - Acidofilní bučiny/Květnaté bučiny		
		EP 2		5B3-4 - Fagi-abieta		
		PP 5,5		LBC05 - <i>Galio rotundifolii-abietetum albae</i>		
		IH – B				
		7,08				
	Je edafickým klimaxem na příznivějších typech oglejených půd v relativně chladnějším mezoklimatu vlhkých stanovišť v 5. lvs. Představuje produkční optimum i centrum rozšíření JD s přirozenou příměsí SM. BK (půdně omezovaný) dosahuje průměrné produkce a přispívá složitější výstavbě prosvětlení „lesů temných“. V cílové skladbě má rozhodující význam pro trvalost ekosystému JD; podílí se významně i na produkci, BK na melioraci (humifikaci).					
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019		do r. 2018			
	0	antropogenní		50k	antropogenní	
	1	modální	šťavelová	50-	modální	
	2	-	ostřicová	50c	sušší, kyselejší	
	3	-	s kostřavou nejvyšší			
	4	-	- podle oblastí			
	5	-	- podle oblastí			
	6	-	- podle oblastí			
	7	skeletnatější				
	8	-				
	9	-	Antropogenní			

