

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA		CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP	PP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		IH			POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		cena			SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
					FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M. CHYTRÝ 2013)	
5P	<b>OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA</b> <i>Abietum piceosum variohumidum acidophilum</i>	SM 26 BO 24 BK 26 EP 2 PP 4,5 IH - B 5,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>vrchoviny a předhůří, zvlněné plošiny a spodní části mírných svahů, krystalinikum s překryvy sprašových a svahových hlín, pseudoglej dystrický, planický či modální oligotrofní, méně kambický, kambizem oglejená podzolovaná, (písčito)hlinitá, vespod jílovitohlinitá</li> <li>PLO: 1-4,6,7,9-16,18-20,23-26,28-31,33,40</li> <li>25 784,54 ha – 0,94 %</li> </ul>	<b>JD 4-7 SM ±3 BK ±1 (BŘ OS LPM) 0± DB 0± BO 0-2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Luzula pilosa, Luzula luzuloides, Maianthemum bifolium, Carex pilulifera, Veronica officinalis, Avenella flexuosa, Deschampsia cespitosa, Polytrichum formosum, Vaccinium myrtillus</i></li> <li>L5.4 - Acidofilní bučiny</li> <li>5AB4 - Abieti-piceeta equiseti inferiora</li> <li>LBE03/LBE04 - <i>Luzulo-Abietetum albae/Vaccinio myrtilli-Abietetum albae</i></li> </ul>		
<p>Představuje v klimatických podmínkách 5. lvs málo vyhraněné společenstvo na styku výraznějších dbJD a smJD. Charakteristická je převaha JD, přirozená účast SM a jen ojedinělý výskyt DB. Podíl BK odvisí od fyzikálních vlastností půdy, příměs BO od charakteru oblasti. V cílové skladbě má nezastupitelný (30 %) podíl JD. BK zabraňuje zhoršení humifikace, přispívá ke zpevnění a výstavbě porostu (přechod k výběrné formě).</p>						
			<b>Lesní typy:</b>		<b>Podsoubory lesních typů (PLT) LČR</b>	
			<b>od r. 2019</b>		<b>do r. 2018</b>	
0	antropogenní					
1	modální			s bikou chlupatou (a metličkou křivolakou)	4P-	modální
2	chudší			– podle oblastí	4Pm	chudší
3	-			borůvková		
4	-			metlicová		
5	vlhčí			(bezkolencová) se třtinou chloupkatou	4Pg	vlhčí
6	-			s bikou chlupatou na pseudoglej. kambizemi		
7	skeletnatější			borůvková		
8	specifická - (s BO) na gabroidech					
9	specifická - s BO				4Pd	borová

