

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5Q	OGLEJENÁ CHUDÁ JEDLINA <i>Abietum piceosum variohumidum oligotrophicum</i>	SM 26	• zvlněné plošiny, mírné svahy, ploché vyvýšeniny i sníženiny, chudé zkaolinizované hlíny, podzol oglejený, glejový, pseudoglej dystrický, pelický, občas glejový, špatně propustná, nevyrovnaně vlhká půda • PLO: 1-3,6,7,12,16,18,19,26,31 • 3 659,56 ha – 0,13 %	JD 5-7 DB 0± SM -2 BK ±2 BO 0-3 BŘP ±1	
		BO 22		• <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Molinia sp.</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Pleurozium schreberi</i> , <i>Polytrichum formosum</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Dicranum undulatum</i> , <i>Sphagnum sp.</i>	
		EP 2		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		PP 2,5		5A4 - <i>Piceeta abietina sphagnosa inferiora</i>	
		IH - C		LBE04 - <i>Vaccinio myrtilli-Abietetum albae</i>	
	3,22				
	Je málo osobitým společenstvem nejchudších půd oglejené řady na přechodu mezi vyhraněnější dbJD a smJD. Charakteristická je převaha JD, ústup DB a přítomnost SM. Omezení BK a účast „pionýrů“, včetně BO, odpovídá půdním podmínkám. V nevyhraněné cílové skladbě při styku BO a SM hospodářství je použitelnost alternativy určována převážně bonitou dřevin. Trvalost ekosystému zajišťuje především JD a příměs listnáčů (BK, BŘP, BR).				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
	0	antropogenní			
	1	modální		borůvková	5Q-
2	-		s rašeliníkem		
3	-		mechová		
4	-		– podle oblastí		
5	vlhčí		s rašeliníkem	5Qr	rašelinná
6	-		– podle oblastí		
7	-				
8	-				
9	specifická - s BO				

