

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5R	Kyselá rašelinná BOROVÁ SMRČINA <i>Pineto-Piceetum turfosum acidophilum</i>	SM 26	• na chudých horninách ve vyšších pahorkatinách a vrchovinách, na náhorních plošinách horských poloh (Krušné hory, Šumava), organozem glejová oligotrofní, podzol histický glejový, • PLO: 1,2,11-13,15,16,18,19,28 • 672,77 ha – 0,02 %	SM 3-8 BO 1-5 BŘP ±2 (OL OS) + • <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Polytrichum commune</i> , <i>Dicranum sp.</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Molinia sp.</i> , <i>Bazzania trilobata</i> , <i>Trientalis europaea</i> , <i>Eriophorum sp.</i> L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny 4-5A6 - Pini-piceeta turfosa LFC04 - <i>Soldanello montanae-Piceetum abietis</i>	
		BO 24			
		EP 3			
		PP 2			
		IH - D			
		3,95			
Je obdobou reliktní (3R) v polohách, kde SM je již přirozený (není extrazonálním reliktem). Zamokřená oligotrofní rašelina s mozaikou rašelinných glejů, vlhké a chladné mezoklima vytvářejí prostředí pro „tajgový“ typ společenstva. V rozvolněných porostech převažuje SM nad poněkud bonitnější BO, v podúrovni přistupuje BŘP, OL a krušina. Cílová skladba odpovídá přirozené, pro ekologickou stabilitu jsou důležité vhodné ekotypy (raš.) SM, BO i příměs BŘP a OL.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		– podle oblastí		5R-
2	-		– podle oblastí		
3	-		bezkolencová		
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

