

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5S	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA <i>Abieto-Fagetum oligomesotrophicum</i>	SM 28	• příznivější relief na na kyselých podložích, nepříznivý relief na bohatších horninách, vrchoviny a nižší horské polohy, kambizem modální, oligotrofní nebo mezotrofní , hluboká, čerstvě vlhká, provzdušněná • PLO: 1-5,7,9-16,18- 31,33,38,40,41 • 153 361,10 ha – 5,60 %	BK 5-7 JD 2-4 JV 0± LP 0-1 (JS JL) 0± SM 0±	
		BO 24		• <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Mycelis muralis</i> , <i>Galium rotundifolium</i> , <i>Rubus idaeus</i> , <i>Senecio nemorensis</i> agg., <i>Viola sylvatica</i> , <i>Maianthemum bifolium</i> , <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Prenanthes purpurea</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i>	
		BK 26		L5.1/L5.4 - Květnaté bučiny/Acidofilní bučiny	
		EP 1		5AB3/5B3 - Abieti-fageta/Abieti-fageta typica	
		PP 5		LBC01/LBE01 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> /Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae	
		IH - A			
		6,71			
Je přechodným společenstvem živné a kyselé řady (Zlatník – FA) s poněkud zpomalenou humifikací a významným podílem JD, který je většinou s BK vyrovnaný. V porostech nadprůměrné produkce je slabě přimíšen SM, především na chudších typech, na bohatších KL v jednodušší prostorové výstavbě. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému BK i JD - v podúrovni svými melioračními účinky a v úrovni zvyšováním stability i produkce cílového SM.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní			5Sk	antropogenní
1	modální	šťavelová (s kapradinami)		5S-	modální
2	chudší	se svízelem drsným			
3	bohatší	s ostřicí prstnatou			
4	sušší	bukovincová		5Sn	kamenitější
5	vlhčí	s kostřavou nejvyšší			
6	-	ochuzená		5Sc	sušší, kyselejší
7	skeletnatější	holá			
8	-	– podle oblastí			
9	-	svahová		5Se	svahová

