

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5V	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA <i>Abieto-Fagetum fraxinosum humidum</i>	SM 30	• ve vrchovinách a předhůřích, prameništří spodní části svahů, potoční úžlabiny, prameniště, terasy, svahy, kambizem modální mezotrofní, oglejená až glejová, méně glej kambický, fluvický, hluboká, hlinitá, vespod vlhká, středně prohumózněná, štěrkovitá • PLO: 1-7,9-16,18-22,23-31,33,38, 40,41 • 24 585,82 ha – 0,90 %	BK 4-7 JD 3-4 JS ±2 JV ±1 (JL LP OL) 0-1 SM 0-1	
		BO 24			
		BK 28			
		EP 4			
		PP 5,5			
	IH - C				
	7,40		L5.1 - Květnaté bučiny		
			5BC-C4 - Aceri-fageta fraxini inferiora		
			LBC02/LBA03 - <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae/Carici remotae-Fraxinetum excelsioris</i>		
	Od klimaxové jdBK se liší oglejenou až glejovou půdou, na bohatších deluviích středně prohumózněnou, a také poněkud vlhčím a chladnějším mezoklimatem potočních zářezů a pramenišť. Tomu odpovídá přirozená skladba s převahou JD a BK, s příměsí SM i cenných listnáčů. V cílové skladbě je pro trvalost ekosystému důležitá JD v úrovni s funkcí zpevňující i produkční. BK z části podúrovňový přispívá k vytváření složitější prostorové výstavby (výběrné formy).				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019	do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	netýkavková		5V-	modální
2	chudší	papratková			
3	bohatší	devětsilová			
4	-	bažanková			
5	-	šťavelová			
6	-	– podle oblastí,			
7	skeletnatější	(podmáčená) šťavelová		5Va	kamenitá acerozní
8	-	– podle oblastí			
9	specifická - podmáčená	podmáčená (prameništří)		5Vg	podmáčená

