

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5W	VÁPENCOVÁ JEDLOVÁ BUČINA <i>Abieto-Fagetum calcarium</i>	SM 26	• na kamenitých svazích a bázích svahů v obvodech krystal. vápenců (Ještěd, předhůří Šumavy), kambizem modální karbonátová, vyluhovaná karbonátová, rendzina kambická , hluboká, kamenitá, svěží • PLO: 12,13,21 • 194,88 ha – 0,01 %	BK 6-8 JD 1-2 JV 1 LP ±1 (JS JL břek) 0± tis + • <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Lathyrus vernus</i> , <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Calamintha clinopodium</i> + vápnomilné druhy L5.3 - Vápnomilné bučiny 5BD-D3 - Abieti-fageta ulmi LBD01 - <i>Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae</i>	
		BK 26			
		EP 4			
		PP 4			
		IH - D			
	5,91				
Je na vyvinuté částečně odvápněné půdě velmi blízká klimaxové jdBK, s níž se shoduje i fytocenózou. V exponovanější (rendzinové) variantě je fytocenóza více „travovitá“ (přechod ke kat. „C“), na přechodu ke kat. „A“ více nitrofilní. Celkově je přirozený ráz lesa listnatější a výstavba jednodušší. Cílová skladba odpovídá přirozené. JD je z větší části nahraditelná. SM je přípustný jen na odvápněných přechodech ke kat. „B“.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		lipnicová s mařinkou	5W-	modální
2	-		– podle oblastí		
3	bohatší		bažanková s netýkavkou		
4	sušší		podle oblastí		
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-		svahová	5We	svahová

