

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
5Y	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA <i>Abieto-Fagetum saxatile</i>	SM 24	• ve vrchovinách, předhůří i v nižších horských polohách na balvanitých, suťových svazích, výstupech skal a na hřebenech, většinou ranker litický, kambický, litozem, na haldách a v lomech antropozemě haldové, nevyvinutá • PLO: 1,3,5,7, 11-14,16,19,21-29,31,38,40,41 • 4 559,08 ha – 0,17 %	BK 4-7 JD 2-4 SM 0-1 BO ±2 JV 0-1 BŘ ±1 LPM 0± JŘ 0 ± tis +		
		JD 22		• <i>Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides, Dryopteris carthusiana, Asplenium sp.</i>		
		BK 22		L5.4 - Acidofilní bučiny		
		EP 5		5A1/5B1/5AB1/5A-AB1 - Abieti-fageta humilia		
		PP 2,5		LBE01 - <i>Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae</i>		
		IH - E				
		3,03				
		Je obdobou suťových (skalnatých) společenstev na kyselém podloží, kde nepříznivá humufikace vylučuje účast cenných listnáčů (a nitrofilní vegetace), ale hloubka a hrubá pórovitost balvanité suti umožňují obohacení půdy kondenzační vláhou a tím ovlivňují skladbu i výstavbu porostů. V přípustné (cílové) skladbě je zvýšené zastoupení SM ekologicky únosné jen při významném podílu BK i JD v úrovňové i spodní etáži prostorové (výběrné) výstavby.				
		Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
		od r. 2019		do r. 2018		
0 antropogenní	- podle oblastí	5Yk	antropogenní			
1 modální	- podle oblastí	5Y-	modální			
2 -	se štavelem	5Ym	chudší			
3 bohatší	metlicová					
4 -						
5 -						
6 -						
7 -						
8 -						
9 specifická - roklínová						

