

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
5Z	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA <i>Abieto-Fagetum humile</i>	SM 22	• balvanité svahy a hřebeny, skalnaté vrcholy, většinou mozaikovitě na místech s vyvinutou půdou, ve vrchovinách, převládá ranker litický, podzolový litozem, mělká - středně hluboká, kamenitá • PLO: 1-5,7,10-14,16,19- 21,23,24,40,41 • 808,87 ha – 0,03 %	BK 5-7 JD 1-3 BO ±3 BŘ ±2 SM±1 (LPM KL) 0±	
		BK 22		• <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Calamagrostis arundinacea</i> , <i>Oxalis acetosella</i>	
		EP 5		L5.4/L5.1 - Acidofilní bučiny/Květnaté bučiny	
		PP 1		5AB1/5A1/5B1/5A-AB(B)1– Abieti-fageta humilia	
		IH - E		LBE01/LBC01 - <i>Luzulo luzuloidis</i> -Fagetum sylvaticae/ <i>Galio odorati</i> -Fagetum sylvaticae	
		4,13			
Je podmíněna extrémně nepříznivými podmínkami nevyvinutých i mělkých vyvinutých půd, popř. silně exponovanou polohou (vrcholový fenomén). Tyto podmínky snižují vitalitu BK i JD a umožňují přirozenou příměs SM, BŘ a BO. Optimální skladbou je přirozená. Zvýšený podíl BO (do 50 %) je přípustný (ekologicky únosný), zajišťuje-li listnatá část porostu, zejména BK, melioraci i krytí půdy pod BO a vhodné mikroklima.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní	– podle oblastí		5Zk	antropogenní
1	modální	– podle oblastí		5Z-	modální
2	chudší	mechová			
3	bohatší	metlicová		5Zb	bazická
4	-				
5	-	vrcholová			
6	-				
7	skeletnatější				
8	-	živná			
9	-	skeletová (se třtinou rákosovitou)		5Zy	skeletnatá

