

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
6A	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOSMRKOVÁ BUČINA <i>Aceri-Piceeto-Fagetum lapidosum</i>	SM 28	• ve vrchovinách a horských polohách, suťovité svahy, hřebeny, úžlabiny, (Boubín), bohaté a středně bohaté podloží, kambizem rankerová či modální, mezotrofní, kryptopodzol rankerový či modální (mezotrofní) , středně hluboká až hluboká, čerstvě vlhká, kamenitá, humózní, nitrofilní • PLO: 1,3,4,12-14,16,19,21-25,27, 28,40,41 • 4 080,23 ha – 0,15 %	BK 4-6 SM 1-3 KL 1-2 JD 1-2 JLH ±1 JS 0±	
		BK 26		• <i>Galium odoratum</i> , <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Lunaria rediviva</i> , <i>Galeobdolon montanum</i> , <i>Prenanthes purpurea</i> , <i>Senecio nemorensis</i> <i>agg.</i> , <i>Festuca altissima</i> , <i>Aruncus sylvestris</i> , <i>Actae spicata</i> , <i>Geranium</i> <i>robertianum</i> , <i>Streptopus amplexifolius</i>	
		EP 4		L5.2 - Horské klenové bučiny	
		PP 4		6BC3 - Abieti-fageta aceris superiora	
		IH – D		LBC04 - <i>Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae</i>	
	6,45				

