

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
6D	OBOHACENÁ SMRKOVÁ BUČINA <i>Piceeto-Fagetum acerosum deluvium</i>	SM 30	• v horách (Šumava), předhůří i vrchoviny, dna úžlabin, báze svahů, kambizem modální mezotrofní, oglejená, kryptopodzol modální (mezotrofní) , hluboká, vlhká, hlinitá, prohumózněná, oglejená, nitrofilní • PLO: 1,3,4,12-14,16,22,24,25,27, 28,40,41 • 1 893,32 ha – 0,07 %	BK 4-6 SM 2-3 JD 2-3 (KL JS JLH LPV) ±1	
		BK 28		• <i>Petasites albus</i> , <i>Impatiens noli-tangere</i> , <i>Chaerophyllum hirsutum</i> , <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Adenostyles alliariae</i> , <i>Carex brizoides</i> , <i>Asarum europaeum</i> , <i>Circaea alpina</i> , <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Lunaria rediviva</i> L5.1 - Květnaté bučiny 6BC3/6B3 - Abieti-fageta aceris inferiora LBC02/LBC04/LBC01/LBE02 - <i>Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae</i>	
		EP 1,5			
		PP 6			
		IH - A			
		8,44			
Klimaxová smBK je v obohacené variantě společenstvem dobře prohumózněných půd, na nichž se obohacení humusem projeví více ve vzrůstu dřevin než v nitrofilním charakteru společenstva. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému BK i JD v hlavní úrovni, kde především JD plní funkci zpevňující i produkční. BK již částečně ustupuje do podúrovně a výrazně se podílí na složitější prostorové výstavbě (výběrné formě). Meliorační funkce je zde méně významná.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019				do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální		netýkavková	6D-	modální
2	chudší		devětsilová		
3	-		bažanková		
4	-		kapradinová(úžlabní)		
5	vlhčí		- podle oblastí		
6	-				
7	-				
8	specifická - terasová				
9	-			6Du	úžlabní

