

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
6F	SVĚŽÍ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA <i>Piceeto-Fagetum lapidosum mesotrophicum</i>	SM 28	• stinné svahy a hřebeny ve vrchovinách a nižších horských oblastech, rokle v nižších polohách, kryptopodzol rankerový, kambizem rankerová oligomezotrofní , kamenitá - balvanitá • PLO: 1,3, 12-14,16,21-25,27,40,41 • 6 326,24 ha – 0,23 %	BK 4-6 JD 2-3 SM 1-3 KL ±2 JLH ±1 JS 0± tis 0±	
		BK 26		• <i>Athyrium filix-femina, Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris polypoides, Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa, Senecio nemorensis agg., Dryopteris dilatata, Streptopus amplexifolius</i>	
		EP 4		L5.4/L5.1 - Acidofilní bučiny/Květnaté bučiny	
		PP 5,5		6B3/6B-BD3 - Abieti-fageta piceae typica	
		IH - C		LBE02/LBC01 - <i>Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae/Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>	
		6,69			
S charakteristickými terénními a půdními vlastnostmi ztrácí ve vlhkém a chladnějším klimatu 6. lvs se zhoršenou humifikací acerózní charakter a shoduje se s typickými klimaxovými společenstvy skladbou dřevin (jen mírně zvýšenou příměsí JD a KL), nadprůměrnou produkcí i prostorovou výstavbou. V cílové skladbě s převahou SM a vysokou produkcí všech cílových dřevin zajišťuje trvalost ekosystému BK a JD v porostech s výstavbou umožňující výběrné formy hospodaření.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	– podle oblastí		6F-	modální
2	-	šťavelová			
3	bohatší				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

