

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)			
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ			
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)			
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)			
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)			
6G	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA (PODMÁČENÁ) <i>Piceeto-Abietum paludosum mesotrophicum</i>	SM 28	• vrchoviny, podmáčené plošky úpadlin a úžlabin, aluviální terasy, glej modální zrašelinělý, pseudoglej glejový - pelický, trvaleji zamokřená • PLO: 1-4,6,7,11-14,16,18-28,30, 31,40 • 13 210,13 ha – 0,48 %	JD 4-5 SM 2-6 BŘ(BŘP) + BK + OL ±1 KL 0± BO 0-1 • <i>Equisetum sylvaticum, Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Sphagnum sp., Deschampsia cespitosa, Circaea alpina, Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, Homogyne alpina, Streptopus amplexifolius</i> L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny 6AB-B4 - Abieti-piceeta equiseti superiora LFC04 - <i>Soldanello montanae-Piceetum abietis</i>			
		EP 3					
		PP 4,5					
		IH - C					
		6,48					
Je společenstvem středně bohatých půd trvale ovlivňovaných stagnující podzemní vodou (často v mozaice se střídavě zamokřovanou smJD). Je charakteristická pro relativně chladnější polohy vrchovin i inverzní polohy nižších lvs. V porostech nadprůměrné produkce má vyrovnané zastoupení SM a JD, na příznivějších půdách příměs BK. Cílová skladba odpovídá přirozené. Nezastupitelná je JD (30 %).							
Lesní typy:						Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019			do r. 2018				
0	antropogenní		sběrný typ			6Gk	antropogenní
1	modální		přesličková			6G-	modální
2	chudší		ostřicová				
3	-		třtinová				
4	-		vysokobylinná				
5	-		kapradinová				
6	-						
7	-						
8	-						
9	-		antropogenní				

