

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
6I	Kyselá hlinitá SMRKOVÁ BUČINA (ULÉHAVÁ) <i>Piceeto-Fagetum illimerosum acidophilum</i>	SM 28	• ve vrchovinách i horských polohách na plošinách a bázích mírných svahů, hlinité překryvy, kryptopodzol oglejený , hluboká, uléhavá • PLO: 3,11-14,16,19,23-25,31 • 6 886,73 ha – 0,25 %	BK 4-7 SM 2-4 JD 2-4 BO 0± BŘ 0±	
		BO 24		• <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Luzula luzuloides</i> , <i>Carex pilulifera</i> , <i>Maianthemum bifolium</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Homogyne alpina</i>	
		EP 1		L5.4- Acidofilní bučiny	
		PP 4,5		6AB3 - Abieti-fageta piceae (Fagi-abieta piceae)	
		IH - A		LBE02 - <i>Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae</i>	
	6,64				
	Chladnější klima, vyšší srážky a minerálně slabší ± oglejené hlinité překryvy částečně snižují vzrůst i konkurenční sílu BK oproti JD a SM (který zejména v inverzních polohách vyniká i vzrůstem). Rozdílné vitality dřevin se odrážejí v prostorové výstavbě porostů. V cílové skladbě je nositelem ekologické (i statické) stability JD a BK. BK s melioračními účinky přispívá k diferenciaci struktury porostu.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
	0	antropogenní			
1	modální	s bikou chlupatou (a třtinou chloupkatou)	6I-	modální	
2	-				
3	-	oglejená se třtinou chloupkatou	6Ig	vlhčí	
4	-	metlicová (borůvková)	6Im	chudší	
5	vlhčí	skeletovitá	6In	kamenitější	
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

