

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
6J	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOSMRKOVÁ JAVOŘINA (SUŤOVÁ) <i>Ulm-Piceeto-Aceretum saxatile</i>	SM24-30	● v horách na suťových a skalnatých svazích, úžlabiny, rokliny, na bohatších i chudších horninách, (Šumava), ranker modální až litický, rendzina litická, litozem , hluboká, vlhkostně příznivá, kamenitá, prohumózněná, nitrofilní ● PLO: 1,13,22 ● 47,90 ha – +%	KL 1-2 SM 4-6 BK 1-2 JD 0-2 JLH 1 JS + JŘ 0± tis 0± BŘ 0±		
		JD 24-26		● <i>Mercurialis perennis, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, Circaea alpina, Chaerophyllum hirsutum</i>		
		BK 24-28		L4 - Suťové lesy		
		KL 22-26		6C3 - Fagi-acereta superiora		
		EP – 6		LBC04/LBF02 - <i>Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae/Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris</i>		
		PP – 2,5				
		IH - E				
		-				
		Jako vyšší stupeň jJIV (v 6. až 8. lvs) má větší zastoupení SM, mírně sníženou bonitu dřevin a méně nitrofilní vegetaci				
		Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019		do r. 2018				
0	antropogenní					
1	modální		6J- modální			
2	chudší					
3	-					
4	-					
5	-					
6	-					
7	-					
8	-					
9	-					

