

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
6K	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA <i>Piceeto-Fagetum acidophilum</i>	SM 26	• vrchoviny a nižší horské stupně, především v hercynské oblasti, svahy, méně zvlněné plošiny, hřbety, kyselý substrát, kryptopodzol modální, výjimečně kambizem modální oligotrofní , středně hluboká, čerstvě vlhká • PLO: 1,3,7,11-14,16,19,21-28,40 • 111 936,93 ha – 4,08 %	BK 4-7 SM 2-4 JD 1-3 BO 0± BŘ+ JŘ +		
		BK 24		• <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Dryopteris dilatata</i> , <i>Trientalis europaea</i> , <i>Maianthemum bifolium</i> , <i>Streptopus amplexifolius</i>		
		BO 24		L5.4/X6 - Acidofilní bučiny/Anthropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla		
		EP 1		6AB3/6A3 - Abieti-fageta piceae/Fageta abietino-piceosa		
		PP 4		LBE02 - <i>Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae</i>		
		IH - A				
		5,04				
Chladnější klima, vyšší srážky spolu s kyselejší půdou podporují SM a mírně omezují BK, takže se jejich podíl vyrovnává při konstantní účasti JD a vytváří se prostorová výstavba s výrazným podílem BK v podúrovni a s příměsí JŘ. Cílová skladba kvalitativně odpovídá přirozené s mírně sníženým podílem BK a JD ve prospěch SM v poněkud zjednodušené výstavbě s BK nižším než SM (v chudších typech zpevňující BO).						
			Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019			do r. 2018			
0	antropogenní		hřebenová	6Kz	zakrslejší	
1	modální		metlicová (– podle oblastí)	6K-	modální	
2	chudší		s ostřicí kulkonosnou			
3	bohatší		borůvková	6Km	chudší	
4	-		třtinová			
5	vlhčí		s kapradí osténkatou agg. (a metličkou)	6Kn	kamenitější	
6	-		metlicová (se šťavelem a bukovincem), (vrcholová)			
7	skeletnatější		– podle oblastí	6Kd	borová	
8	-		– podle oblastí			
9	specifická - vrcholový fenomén		svahová (– podle oblastí)	6Ke	svahová	

