

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
6L	LUH OLŠE ŠEDÉ <i>Alnetum incanae</i>	OLŠ 22-26	• aluviální kamenité náplavy horských oblastí, (prameniště), fluvizem psefitická oglejená, glej fluvický hydroeluviovaný skeletovitý , písčitohlinitá až hlinitopísčítá, (štěrk, kameny) • PLO: 12,13,22, 25,40,41 • 229,30 ha – 0,01 %	OLŠ 6-8 SM ±1 KL ±1 JD 0± JS 0-1 BŘ ±1 JŘ + JLH 0± • <i>Petasites albus</i> , <i>Petasites kablikianus</i> , <i>Cicerbita alpina</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Chaerophyllum hirsutum</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Crepis paludosa</i> , <i>Stellaria nemorum</i> , <i>Chrysosplenium alternilolium</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Ranunculus aconitifolius</i> L2.1 - Horské olšiny s olší šedou 6BC-C5A - <i>Alneta incanae</i> LBA01 - <i>Alnetum incanae</i>		
		SM 26-30				
		EP 6				
		PP 3				
		IH - E				
		3,02				
	Je společenstvem aluvií bystřin, potoků a pramenišť horských oblastí. Jeho existenci podmiňuje vlhká a studená kamenitá půda, chladné mikroklima potočních teras a úzkých horských údolí s častými mlhami, jarními mrazy a vysokou vlhkostí. Naplaveniny mají příznivější fyzikální vlastnosti než prameniště. Převládá OLŠ (ochrana proti břeh. erozi), v příměsi SM, na sušších lokalitách KL, JD, OS (BK), v nižších polohách OLL a JS. Přirozená skladba je i cílovou.					
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019			do r. 2018		
	0	antropogenní				
	1	modální	na náplavech (řek a potoků) (bystřin)	6L-	modální	
	2	-	prameništní	6Lr	prameništní	
	3	-	trsnatá			
	4	-				
	5	-				
	6	-	podél vodotečí			
	7	-				
	8	-				
	9	-				

