

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘÍROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (<i>natural species composition</i>)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
6M	CHUDÁ SMRKOVÁ BUČINA <i>Piceeto-Fagetum oligotrophicum</i>	SM 22	- chudé substráty převážně ve vrchovinách a nižších horských polohách, na plošinách, hřebenech i svazích, podzol modální horský, kryptopodzol modální, středně hluboká, písčitá – hlinitopísčitá, kamenitá - PLO: 1,3,7,11-14,16,19,22,24 2 463,28 ha – 0,09 %	BK 4-7 SM 2-4 JD 1-3 BO 0-2 BŘ ±1	
		BO 22		<i>Vaccinium myrtillus</i>, <i>Vaccinium vitis-idaea</i>, <i>Calluna vulgaris</i>, <i>Calamagrostis villosa</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Polytrichum formosum</i>, <i>Dicranum scoparium</i>, <i>Dicranum undulatum</i>, <i>Pleurozium schreberi</i>	
		EP 1		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		PP 2		6A3 - Fageta abietino-piceosa	
		IH - C		LBE02 - <i>Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae</i>	
		2,27			
				Chladnější podnebí a vyšší srážky na jedné straně, minerálně chudé a kyselé půdy s hromaděním nadložního humusu na straně druhé vymezují podmínky klimaxových dřevin mírně ve prospěch SM, s částečným potlačením náročnějších BK a JD a vytvořením neúplné prostorové výstavby. V cílové skladbě na styku SM a BO hospodářství jsou obě dřeviny ekonomicky i stanovištně vhodné (BO i zpevňující). BK, popř. JD, převážně v podúrovni, plní funkci meliorační.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019	do r. 2018
0	antropogenní				
1	modální		mechová	6M-	modální
2	-		brusinková		
3	-		borůvková		
4	-		hasivková		
5	vlhčí		s BO borůvková	6Md	borová
6	-				
7	skeletnatější				
8	-				
9	specifická - s BO		svahová	6Me	svahová

