

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
60	OGLEJENÁ SVĚŽÍ SMRKOVÁ JEDLINA <i>Piceeto-Abietum variohumidum mesotrophicum</i>	SM 28	• vrchoviny, báze svahů, plošiny, překryvy hlín na různém podloží, pseudoglej modální, kryptopodzol oglejený, (kambizem oglejená), hluboká, vespod jílovitá, střídavě vlhká • PLO: 1,3,4,7,11-14,16,19-21,23- 28,30,31,40,41 • 18 000,99 ha – 0,66 %	JD 4-7 SM 1-5 BK 1-2 OLŠ + OS 0± KL 0±	
		BO 24		• <i>Oxalis acetosella, Carex brizoides, Deschampsia cespitosa, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis villosa, Festuca gigantea, Luzula pilosa, Senecio nemorensis agg., Homogyne alpina, Soldanella montana, Prenanthes purpurea</i> L5.4 - Acidofilní bučiny 6AB4 - Abieti-piceeta equiseti superiora LBE03 - <i>Luzulo-abietetum albae</i>	
		BK 26			
		EP 2			
		PP 5,5			
		IH - B			
		6,64			
	Je edafickým klimaxem na příznivějších typech oglejených půd (ale zpomaleném rozkladu opadu – moder) v relativně chladnějším mezoklimatu s převahou JD a SM nadprůměrné bonity a méně vzrůstným BK, který přispívá k vytvoření složitější struktury porostu i zlepšení humifikace půd. V cílové skladbě zajišťuje trvalost ekosystému jen významný (30 %) podíl JD. BK se podílí na vysoké produkci porostu jen částečně, více na výstavbě a meliorační funkci.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
	0	antropogenní		6Ok	antropogenní
	1	modální	šťavelová	6O-	modální
	2	-	ostřicová		
	3	-			
	4	-	ostřicová		
	5	-	skeletovitá se šťavelem		
	6	-	na hrůdech (s hluchavkou skvrnitou)		
	7	skeletnatější		6On	kamenitější
	8	-			
	9	-	Antropogenní		

