

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
6P	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA <i>Piceeto-Abietum variohumidum acidophilum</i>	SM 28	• ve vrchovinách (Českomoravská, Brdská, Lužická, Karlovarská), zvlněné plošiny, mírné svahy a terasy, chudší podloží, kryptopodzol oglejený, pseudoglej dystrický, modální oligotrofní , střídavě zamokřovaná, hlinitá, (kamenitá), vlhkostně vyrovnaná • PLO: 1-4,7, 11-14,16,18-20,22,23- 28,30,31,40 • 30 041,51 ha – 1,10 %	JD 4-5 SM 2-6 BO 0-1 BK ±2 (BŘ BŘP OS) 0±	
		BO 24		• <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Trientalis europaea</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Luzula pilosa</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Dicranum scoparium</i> , <i>Pleurozium schreberi</i> , <i>Polytrichum formosum</i>	
		BK 24		L5.4 - Acidofilní bučiny	
		EP 2		6A4 - <i>Piceeta abietina sphagnosa superiora</i>	
		PP 4,5		LBE04 - <i>Vaccinio myrtilli-Abietetum albae</i>	
		IH - B(C) 5,82			
	V kyselé smJD jsou ve vlhčím a chladnějším klimatu 6. lvs oglejené půdy vlhkostně vyrovnanější i v sušším období. V dřevinné skladbě s vyrovnaným podílem JD a SM („lesy temné“) se příměs BK udržuje na příznivějších, BO na chudších typech. Složitost výstavby stoupá s BK a klesá při převaze SM. Cílová skladba odpovídá přirozené se zvýšeným podílem bonitně nadprůměrného SM. Nositelem ekologické stability je JD, v podúrovni je melioračně účinný BK.				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
	0	antropogenní			
	1	modální	třtinová	6P-	modální
	2	chudší	metlicová (s borůvkou) (s bikou chlupatou)	6Pm	chudší
	3	-	- podle oblastí		
	4	-	- podle oblastí		
	5	vlhčí	- podle oblastí	6Pt	vlhčí chudší
	6	-	s borovicí na hadci		
	7	skeletnatější		6Pn	kamenitější
	8	specifická - s BO na hadci a serp. vyvř.		6Pf	hadcová
	9	specifická - s BO		6Pd	borová

