

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
6T	GLEJOVÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA (PODMÁČENÁ) <i>Piceeto-Abietum paludosum oligotrophicum</i>	SM 24	• v kopcovinách a vrchovinách v obvodu chudších kyselejších hornin, plošiny v pokleslinách, úžlabiny, inverzní polohy, (Lužická pahorkatina), glej histický podzolovaný, podzol histický glejový , zamokřená, minerálně slabá, písčitohlinitá až jílovitohlinitá • PLO: 12,20,21 • 393,09 ha – 0,01 %	JD 5-6 SM 4-6 BO 0-1 BŘ(BŘP) 0± (JŘ OS OLŠ) 0±	
		EP –3		• <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Molinia sp.</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Trientalis europaea</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Polytrichum commune</i> , <i>Leucobrium glaucum</i>	
		PP- 3			
		IH – D		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		2,90		6A4 - <i>Piceeta abietina sphagnosa superiora</i> LFC04 - <i>Soldanello montanae-Piceetum abietis</i>	
Chudá podmáčená smJD je málo vyhraněným vyšším stupněm chudých jedlin na přechodu do podmáčených chudých jdSM.					
		Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
		od r. 2019	do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		- podle oblastí	6T-	modální
2	-				
3	-				
4	-		rašeliníková	6Tr	rašelinná
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	specifická - s BO			6Td	borová

