

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISŤE (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)				
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ				
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)				
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)				
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)				
6Z	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA <i>Piceeto-Fagetum humile</i>	SM 22	• silně exponované svahy a vrcholy, ve vrchovinách a v horách, převládá ranker podzolový až litický, kryptopodzol, litozem , mělká - středně hluboká, kamenitá • PLO: 1,3,7,11-14,19,21-25,27,40 • 1 332,11 ha – 0,05 %	BK 4-5 SM 2-4 JD ±1 BO ±2 (BŘ KL JŘ) ±1				
		BK 22		• <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Streptopus amplexifolius</i> , <i>Homogyne alpina</i>				
		EP 5		L5.4/L5.1 - Acidofilní bučiny/Květnaté bučiny				
		PP 1,5		6A-AB2v/6A2v/6AB2v - Abieti-fageta piceae humilia				
		IH - E		LBE02/LBC01 - <i>Calamagrostis villosae-Fagetum sylvaticae</i> / <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae</i>				
		2,90						
		V příznivě vlhkém klimatu 6. lvs vznikají extrémně nepříznivé ekologické podmínky při spojení mělké či kamenné půdy s exponovanou polohou svahů nebo hřebenů (vrcholový fenomen) omezující růst všech klimaxových dřevin ve společenstvu zakrslé smBK. V rozvolněných porostech tvoří hluboce zavětvený SM s listnáči a JD ± prostorovou výstavbu. Cílová (přípustná) skladba je shodná s přirozenou. Trvalost ekosystému zajišťuje především BK. Nahraditelná je JD (náročné zavádění).						
		Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR			
		od r. 2019		do r. 2018				
		0		antropogenní	– podle oblastí		6Zk	antropogenní
1	modální	– podle oblastí		6Z-	modální			
2	chudší	třtinová						
3	bohatší	metlicová (se třtinou chloupkatou)		6Zs	bohatší			
4	-	s BO borůvková						
5	-							
6	skeletnatější	vrcholová						
7	specifická - s BO							
8	zakrslá smrková jedlina - vrcholový fenomén	živná		6Zjd	jedlová			
9	specifická - vrcholový fenomén	skeletová		6Zy	skeletnatá			

