

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
7A	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOBUKOVÁ SMRČINA <i>Aceri-Fageto-Piceetum lapidosum</i>	SM 24	• v pásmu přirozených smrčín, kamenité podhřebenové svahy, svahové sutě a údolní polohy, kryptopodzol rankerový, méně podzol rankerový a ranker podzolový , vlhká (ve spodině mokrá), silně kamenitá, prohumózněná • PLO: 1,22,27 • 80,89 ha – +% (nová jednotka <- 8A)	SM 8 (BK KL) 2 JŘ + JD + JLH+	
		EP 5,5		• <i>Athyrium distentifolium, Mulgedium alpinum, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Gymnocarpium dryopteris, Aruncus sylvestris</i>	
		pp 3		L5.2 - Horské klenové bučiny	
		IH - E		6BC3 - Abieti-fageta aceris superiora	
		-		LBC04 - <i>Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae</i>	
Spojuje v 8. lvs a v 7. lvs bohatá i humusem obohacená stanoviště, neboť indikátory „bohatosti“ jsou zde druhy nitrofilní. Rozklad opadu je však v důsledku humidního klimatu zpomalený a přispívá spolu s celkově drsným klimatem ke zjednodušené porostní skladbě a výstavbě. Zastoupení BK, KL i JD i jejich vzrůst stoupá při spodní hranici. V cílové skladbě je pro trvalost ekosystému rozhodující příměs listnáčů (BK, KL) a vhodný ekotyp SM. Vůči 7F málo vyhraněné.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	kapradinová (zrušené 8A ->)		7A- (8A-)	modální
2	-			(8Av)	vysokohorská
3	-				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

