

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
7F	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ SMRČINA <i>Fageto-Piceetum lapidosum mesotrophicum</i>	SM 26	- kamenité stinné svahy a hřebeny v horských oblastech, na různých horninách, kryptopodzol rankerový, kamenitá, zpomalená humifikace - PLO: 1,13,22,25,27,40 660,41 ha – 0,02 %	SM 6-7 BK 2-3 JD ±2 KL 0-1 JŘ +	
		EP 4,5		<i>Athyrium filix-femina</i>, <i>Athyrium distentifolium</i>, <i>Blechnum spicant</i>, <i>Gymnocarpium dryopteris</i>, <i>Trientalis europaea</i>, <i>Homogyne alpina</i>, <i>Senecio nemorensis</i> agg., <i>Calamagrostis villosa</i>, <i>Dryopteris dilatata</i>	
		PP 4		L9.3/L5.2 - Horské papratkové smrčiny/Horské klenové bučiny	
		IH – D		6B3 - Abieti-fageta piceae typica	
		5,20		LFC02/LBC04 - <i>Athyrio distentifolii-Piceetum abietis</i> / <i>Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae</i>	
				Je typickou horskou smíšenou SM (bez acerózních prvků) v exponovanějších terénech s kamenitou půdou a se zpomalenou humifikací. Klimatické i půdní podmínky vyhovují SM, méně JD (podle polohy) a značně omezují vitalitu BK, většinou podúrovňového ve vrstevnaté výstavbě. Cílová skladba se shoduje s přirozenou. Rozhodující pro trvalost ekosystému je vedle příměsi JD (zpevnění) a BK (meliorace) i vhodný vysokohorský ekotyp SM.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
				0 antropogenní	
1	modální		kapradinová	7F-	modální
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				

