

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
7G	GLEJOVÁ JEDLOVÁ SMRČINA (PODMÁČENÁ) <i>Abieto-Piceetum paludosum mesotrophicum</i>	SM 26 EP 3,5 PP 4,5 IH - C 4,92	• vrchoviny, hory, inverzní polohy pahorkatin, podmáčené plošky mělkých sníženin, podsvahové plošiny a úžlabiny, glej modální zrašelinělý , hluboká, podzemní voda 0,3 – 0,9 m • PLO: 1,3,4,7,11-14,16,19,21-23, 25,27,28,40 • 11 261,37 ha – 0,41 %	SM 7-9 JD ±2 BO 0-1 (BŘP JŘ OLŠ KL) 0± • <i>Equisetum sylvaticum</i> , <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Sphagnum</i> sp., <i>Polytrichum commune</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Dryopteris dilatata</i> , <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Athyrium distertifolium</i> , <i>Homogyne alpina</i> , <i>Trientalis europaea</i> L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny 6AB4 - <i>Abieti-piceeta equiseti superiora</i> LFC03 - <i>Equiseto sylvatici-Piceetum abietis</i>	
Je společenstvem glejových zrašelinělých půd terénních úpadlin, oproti svému okolí relativně chladnějších a vlhčích (mrazové polohy). Tyto podmínky vyhovují SM, snáší je JD a z listnáčů jen pionýrská BŘP, OLŠ a JŘ(OS). V některých oblastech se dokládá i autochtonní náhorní BO. Cílová skladba odpovídá přirozené („lesy temné“). Zárukou trvalosti ekosystému je podíl JD, vhodnost ekotypu SM i příměs BŘP, OLŠ.					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální	přesličková		7G-	modální
2	chudší				
3	-	třtinová			
4	-	potoční			
5	-	– podle oblastí			
6	-				
7	skeletnatější	se šťavelem			
8	-				
9	-	svahová			

