

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
7L	SMRKOVÝ LUH <i>Piceetum alluviale</i>	SM 26-30	- specifické aluviální náplavy horských oblastí, fluvizem arenická, psefitická, oglejená, glejová, kambická, písčitohlinitá až písčitá, případně skeletovitá (štěrk, kameny) - PLO: 12,13,16,22 172,72 ha 0,01 % (nová jednotka)	SM 3-9 OLŠ ±2 JD 0-1 KL ±1 BŘ ±1 JŘ + JLH 0± BO 0-1	
		EP 6		<i>Carex rostrata</i>, <i>Petasites albus</i>, <i>Cicerbita alpina</i>, <i>Deschampsia cespitosa</i>, <i>Equisetum sylvaticum</i>, <i>Carex brizoides</i>, <i>Calamagrostis villosa</i>, <i>Sphagnum sp.</i>, <i>Athyrium distentifolium</i>, <i>Crepis paludosa</i>, <i>Stellaria nemorum</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Chaerophyllum hirsutum</i>	
		PP 3		L9.3/L9.1 - Horské papratkové smrčiny/Horské třtinové smrčiny	
		IH - E		6AB4 - Abieti-piceeta equiseti superiora	
		-		LFC02/LFC01 - <i>Athyrio distentifolii-Piceetum abietis/Calamagrostio villosae-Piceetum abietis</i>	
				Je společenstvem širších horských aluvií, jen občas zaplavovaných. Jeho existenci podmiňuje vlhká a studená (někdy kamenitá) půda, chladné mikroklima potočních teras a úzkých horských údolí s častými mlhami, jarními mrazy a vysokou vlhkostí. Převládá SM s příměsí OLS, JD, KL, BO. Přirozená skladba je i cílovou.	
				Lesní typy:	
				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
				od r. 2019 do r. 2018	
0	antropogenní				
1	modální		7V, 7G, 7O ->	7L-	modální
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	specifický - skeletnatý				

