

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)		
7N	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ SMRČINA <i>Fageto-Piceetum lapidosum acidophilum</i>	SM 22	• v horských oblastech, kamenité a balvanité svahy a hřebeny, kryptopodzol rankerový, často modální horský podzol rankerový až podzolový ranker , středně hluboká, propustná, čerstvě vlhká • PLO: 1,3,7,11,13, 14,21,22,25,27,28,40 • 7 834,21 ha – 0,29 %	SM 7-8 BK 1-3 JD ±1 BO 0± KL + (BŘ JŘ) +		
		BK 22		• <i>Dryopteris dilatata, Calamagrostis villosa, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Luzula luzuloides, Oxalis acetosella, Streptopus amplexifolius, Dicranum scoparium, Lycopodium annotium</i>		
		EP 4		L9.1/L5.4 - Horské třtinové smrčiny/Acidofilní bučiny		
		PP 4		6AB3/6A3 - Abieti-fageta piceae/Fageta abietino-piceosa		
		IH - D		LFC01/LBE11 - <i>Calamagrostio villosae-Piceetum abietis/Calamagrostio villosae- Fagetum sylvaticae</i>		
		2,95		Humidní klima s nízkými průměrnými teplotami spolu s kyselými kamenitými půdami omezují vitalitu BK, méně JD. Při převaze SM se vytváří nevýrazně vrstevnatá struktura úrovnových SM a JD (BO) s hlubokými korunami a s BK a JŘ v podúrovni (v mezerách). Cílová skladba odpovídá přirozené (regionálně) se využije i autochtonní BO). Trvalost ekosystému závisí na JD v úrovni, melioračních účincích BK a KL v podúrovni a vhodném (horském) ekotypu SM.		
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	od r. 2019		do r. 2018			
	0	Antropogenní	– podle oblastí (s očky sutí)		7Ny	skeletovitá
	1	Modální	s kapradí rozloženou (a třtinou chloupkatou)		7N-	modální
2	Chudší	se třtinou rákosovitou				
3	Bohatší	se šťavelem				
4	-	borůvková		7Nm	chudší	
5	-					
6	-					
7	Skeletnatější					
8	-					
9	-					

