

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVISŤE (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
70	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLOVÁ SMRČINA <i>Abieto-Piceetum variohumidum mesotrophicum</i>	SM 28	• horské oblasti, méně vrchoviny, zvlněné plošiny, báze svahů, ploché úžlabiny, kryptopodzol oglejený, pseudoglej dystrický, místy glej kambický , hluboká, střídavě – trvale vlhká, vespod jílovitá • PLO: 1,3,4, 13,14,19,21,22,27 • 5 677,51 ha – 0,21 %	SM 6-8 JD 1-3 BK ±2 KL 0± (BŘ JŘ OLŠ) 0±	
		EP 2,5		• <i>Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, Senecio nemorensis agg., Luzula pilosa, Deschampsia cespitosa, Circaea alpina, Avenella flexuosa, Homogyne alpina, Soldanella montana, Carex brizoides, Streptopus amplexifolius</i> L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny 6AB4 - Abieti-piceeta equiseti superiora LFC03 - <i>Equiseto sylvatici-Piceetum abietis</i>	
		PP 5			
		IH - B			
		6,56			
Zaujímá relativně nejprůzračnější stanoviště oglejených až glejových půd (vodou neobohacovaných) v chladném a vlhkém horském klimatu i v inverzních polohách vrchovin. Výstavba porostů se liší podle stupně zamokření. V cílové i přirozené skladbě se BK udrží jen v průzračnějších podmínkách (polohách) jako příměs v podúrovni. Rozhodující pro statickou i ekologickou stabilitu je úrovněná JD a vhodný ekotyp horského SM oglejených půd (oblastně i BO ekotyp).					
Lesní typy:				Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
od r. 2019		do r. 2018			
0	antropogenní				
1	modální		šťavelová (s kapradinami)	70-	modální
2	-				
3	-		s bikou lesní		
4	-				
5	-		skeletovitá se šťavelem		
6	-				
7	skeletnatější				
8	-				
9	-				

