

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
7Q	OGLEJENÁ CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA <i>Abieto-Piceetum variohumidum oligotrophicum</i>	SM 24	• v horských oblastech i vrchovinách, plošiny, mírné sklony, úpadliny, podzol glejový, pseudoglej dystrický zrašelinělý, vlhkostně vyrovnanější, (přechod k trvale zamokřené), slabě propustná • PLO: 1,3,13,27 • 138,29 ha – 0,01 %	SM 6-8 JD 1-3 BK ±1 BO 0± (BŘP JŘ) +	
		EP 2,5		• <i>Calamagrostis villosa</i> , <i>Molinia sp.</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Polytrichum commune</i> , <i>Sphagnum sp.</i> , <i>Bazzania trilobata</i> , <i>Homogyne alpina</i>	
		PP 2,5		L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny	
		IH - D		6A4 - <i>Piceeta abietina sphagnosa superiora</i>	
		3,17		LFC04 - <i>Soldanello montanae-Piceetum abietis</i>	
	Na nejchudších typech ± zrašeliněných oglejených (podzolových) půd ve vyšších horských a inverzních polohách, vyhovují ekologické podmínky převažujícímu SM, méně již JD. V příznivějších (sušších) lokalitách se udržuje málo vzrůstný BK, častý je přirozený výskyt BO náhorního ekotypu. Cílová skladba zcela odpovídá přirozené. Pro trvalost ekosystému je důležitá JD, především v úrovni, a ekotypicky vhodný SM (oblastně i náhorní BO).				
	Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
	od r. 2019		do r. 2018		
	0	antropogenní			
	1	modální	borůvková	7Q-	modální
	2	-			
	3	-	s BO bezkolencová	7Qr	rašelinná
	4	-			
	5	-			
	6	-			
	7	-			
	8	-			
	9	specifická - s BO			

