

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)	
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)	
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M.CHYTRÝ 2013)	
7R	KYSELÁ RAŠELINNÁ SMRČINA <i>Piceetum turfosum acidophilum</i>	SM 22 EP 4,5 PP 3 IH - D 2,81	• ploché úžlabiny, náhorní plošiny a poklesliny s podložím krystalinika a pískovců, v horských polohách (Krušné hory, Jizerské hory, Šumava), méně ve vrchovinách, organozem glejová až fibrická oligotrofní, podzol histický glejový, • PLO: 1,3,7,11-14,16,19,21-25,27, 28 • 5 593,40 ha – 0,20 %	SM 9-10 BO 0-1 BŘP ±1 JŘ + • <i>Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Eriophorum sp., Polytrichum commune, Dicranum sp., Lycopodium annotinum, Bazzania trilobata</i> L9.2 - Rašelinné a podmáčené smrčiny 6-7A6 - Piceeta turfosa LFD04 - <i>Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis</i>	
Je ve stupních přirozeného rozšíření SM vázána na oligotrofní rašeliny s přechodem k vrchovištím a na jejich drsnější mezoklima, které umožnily dominanci podprůměrného hluboce zavětveného SM doprovázeného v rozvolněných porostech jen BŘP, JŘ, popř. BO, zejména na přechodech do boSM. Cílová skladba se shoduje s přirozenou, autochtonní BO přispívá stabilitě i produkci.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
od r. 2019			do r. 2018		
0	antropogenní				
1	modální		třtinová (s metličkou křivolakou)	7R-	modální
2	-		– podle oblastí		
3	-		bezkolencová		
4	sušší		s kapradí široolistou		
5	-		rašeliníková		
6	-				
7	-				
8	-				
9	specifická - zakrslá				

